Cuadro comparativo de inhibidores de JAK

	Zenrelia™ (ilunocitinib)[1]	apoquel® (oclacitinib)[2]	Numelvi® (atinvicitinib)[3]	CONCLUSIÓN
Indicado para el tratamiento de perros con dermatitis alérgica y atópica	✓	✓	✓	Todos los productos son inhibidores de JAK que pueden utilizarse en perros con dermatitis alérgica y atópica.[1-3]
Administración conveniente, lo que optimiza el cumplimiento del propietario	✓ Dosificación una vez al día desde el día uno	✗ Dosificación BID durante un máximo de 14 días, luego dosificación una vez al día	✓ Dosificación una vez al día desde el día uno	Zenrelia ofrece una dosificación sencilla una vez al día desde el día uno para todos los perros alérgicos y atópicos, lo que mejora el cumplimiento del propietario.
Se puede administrar con o sin alimento.	✓	✓	✗ Se debe administrar durante la alimentación o alrededor de ese momento	Zenrelia puede administrarse independientemente de los horarios de alimentación.
Inicio rápido del alivio de la picazón[4]	✓	✓	✓	Se ha demostrado que todos los inhibidores de JAK reducen rápidamente la picazón debido a su mecanismo de acción.
Ayuda a que los perros vuelvan a niveles normales de picazón (PVAS <2, comparables a los de perros no alérgicos)^[4,5]	**77 %** de los perros alcanzaron un nivel normal de picazón después de 4 meses de tratamiento[4]	**53 %** de los perros alcanzaron un nivel normal de picazón después de 4 meses de tratamiento[4]	No hay datos comparables de 4 meses disponibles	Zenrelia ayuda a que un 45 % más de perros vuelvan a niveles normales de picazón en comparación con Apoquel.[4]
Alivio continuo e ininterrumpido de la picazón hasta el día 112.[4]	✓ Sin efecto rebote de la picazón[4]	✗ Posible efecto rebote de la picazón[6]	No hay datos comparables de 4 meses disponibles	Gracias a la dosificación constante, Zenrelia brinda un alivio ininterrumpido y a largo plazo de la picazón.
Eficacia y seguridad comprobadas en estudios de campo de más de 28 días de duración	✓	✓	✗	Zenrelia cuenta con múltiples estudios de campo con seguimiento hasta el día 112.[4,7,8]
La eficacia y la seguridad se compararon directamente con otro inhibidor de JAK en un ensayo clínico.	✓	✓	✗	Zenrelia demostró un control significativamente mejor del prurito y de las lesiones cutáneas en comparación con Apoquel en un ensayo clínico comparativo de 112 días.[4^]
Resultados del estudio publicados en detalle en revistas científicas revisadas por pares	✓	✓	✗	Siete publicaciones en revistas científicas revisadas por pares ponen de relieve la eficacia y la seguridad de Zenrelia.[4,7,8, 9-12]
Es seguro usarlo con vacunas; no se requiere interrumpir el tratamiento	✓	✓	✓	Zenrelia es bien tolerado y no interfiere con las vacunas de refuerzo, incluso cuando se administra a una dosis tres veces superior a la recomendada.[12]
Preferencias de inhibición de JAK in vitro	JAK1, JAK2 y TYK2	JAK1 y JAK3	JAK1	Los perfiles de selectividad *in vitro* no pueden traducirse directamente en el desempeño en el mundo real. Los datos de los ensayos clínicos son fundamentales para evaluar la eficacia clínica y la seguridad de un producto.[13]
El envase primario facilita la dispensación de blísteres individuales	✓ Blíster de 10 comprimidos	✓ Blíster de 10 comprimidos	✗ Blíster de 30 comprimidos	Los blísteres de 10 comprimidos de Zenrelia permiten una dispensación personalizada para satisfacer las necesidades específicas del paciente.

Afirmaciones basadas en la información de producto de Zenrelia™, Apoquel® y Numelvi® de (insertar nombre del afiliado), vigente al (insertar fecha correspondiente). Lea los prospectos de los productos para obtener instrucciones completas.

References:
Zenrelia SPC. 2. Apoquel SPC. 3. Numevli SPC. 4. Forster, S et al. Vet Dermatol. 2025;36(2):165-176. 5. Rybníček et al. Vet Dermatol. 2009 Apr;20(2):115-22. 6. Olivry T. et al. Vet Dermatol. 2023;34:99–106. 7. Forster, S et al. Vet Dermatol. 2025;36(6):825-837. 8. Forster, S et al. Vet Dermatol. 2025;36(5):647-659. 9. Boernagen K. et al. JVPT. 2026;49:7-16. 10. Kuntz EA, et al. BMC Vet Res. 2025;21:144. 11. Fent GM, et al. BMC Vet Res. 2025;21:461. 12. Fent GM, et al. BMC Vet Res. 2025;21:481. 13. Bonelli M et al. Ann Rheum Dis. 2024;83(2):139–160. 14. Elanco data on file, 2026. 15. Hill P.B. et al. Vet Dermatol. 2007 Oct;18(5):301-8.

^ Results from comparison between Apoquel and Zenrelia: primary endpoint was non-inferiority demonstrated at day 28. At Day 112, 77% of dogs treated with Zenrelia achieved PVAS <2 compared to 53% of dogs treated with Apoquel**. Secondary end point p-values are not adjusted for multiple testing; therefore, caution should be exercised in interpretation. This was a subset of dogs treated for a total of 112 days.

A "normal" itch score is considered to be comparable to that of a healthy, non-allergic dog (PVAS<2). Pruritus Visual Analog Scale (PVAS) is a tool to help measure the level of itch in dogs. It is a linear scale from '0' to '10' with increasing numbers corresponding to increasing severity of itch.[15]

Add additional mandatory text according to local regulations.

Zenrelia, Elanco and the diagonal bar logo are trademarks of Elanco or its affiliates. Apoquel is a registered trademark of Zoetis. Numevli is a registered trademark of MSD.
© 2026 Elanco or its affiliates. PM-INT-26-0100.