# Zenrelia™

Zenrelia, un **inhibidor de JAK** de primera línea para el alivio eficaz de la picazón y la inflamación

## Las citocinas, los receptores y las enzimas JAK intervienen en la mediación de la picazón alérgica y la inflamación.

### Ciclo de picazón y rascado[1]




### Mediadores clave del ciclo de picazón y rascado[2]

#### Citocinas

| Fase aguda | Fase crónica |
|---|---|
| IL-4 | IL-12 |
| IL-5 | IL-19 |
| IL-13 | IL-22 |
| IL-31 | |


#### Enzimas JAK

Hay cuatro enzimas JAK implicadas en la señalización de las citocinas, que actúan en grupos de dos o más:[3]

JAK1 JAK2 JAK3 TYK2

## Los inhibidores de JAK bloquean el efecto de las citocinas e interrumpen el ciclo de picazón y rascado

### Receptores de citocinas y sus enzimas JAK asociadas[4,5]




### Múltiples enzimas JAK intervienen en la señalización de las citocinas implicadas en la alergia.[4,5]

- Zenrelia se dirige a múltiples enzimas JAK (JAK 1, JAK 2 y TYK 2).
- Zenrelia bloquea el efecto de las citocinas que intervienen tanto en las fases agudas como en las crónicas.

BC_Zenrelia_JAK-inhibitor Selectivity Leaflet_A4_2pp_final_es-LA.indd 1 9/2/2026 9:23:02 PM

# El perfil de selectividad de los inhibidores de JAK no predice la seguridad clínica.


- No existen estudios en medicina humana ni veterinaria que demuestren una correlación entre la selectividad de los inhibidores de JAK y su seguridad.[4]
- **Los estudios** *in vivo* son la única manera de determinar la eficacia clínica y la seguridad de un tratamiento.[4]
- Tras una evaluación exhaustiva, Zenrelia demostró un perfil de seguridad comparable al de oclacitinib.[6]

## Zenrelia: ayuda a que más perros con picazón vuelvan a la normalidad que oclacitinib[6]*

Zenrelia actúa sobre múltiples enzimas JAK e inhibe de forma integral las citocinas implicadas en la picazón y la inflamación.[2,6]



**77 %** de los perros vuelven a la normalidad con Zenrelia[6]



**53 %** de los perros vuelven a la normalidad con oclacitinib[6]

## Alivia la picazón. Recupera la calma. Elige Zenrelia.

- **Para todos los tipos de enfermedades alérgicas de la piel: alérgenos ambientales, alimento, pulgas**
- **Puede utilizarse durante las pruebas dietarias** (sin sabor, lactosa ni proteínas de origen animal)
- **Alivia la picazón Y la inflamación; para casos agudos Y crónicos**



Los comprimidos recubiertos de Zenrelia™ contienen ilunocitinib. Categoría legal POM-V en el Reino Unido. POM en Irlanda. Para obtener más información, llame a Elanco Animal Health al +44(0)1256 353131 o escriba a: Elanco UK AH Limited. Form 2, Bartley Way, Bartley Wood Business Park, Hook, RG27 9XA, Reino Unido. Para obtener más información, consulte el resumen de características del producto. Zenrelia, Elanco y el logotipo de la barra diagonal son marcas comerciales de Elanco o sus filiales.

© 2025 Elanco o sus filiales PM-INT-25-0349. Fecha de preparación: 12/25.

Antes de usar el medicamento, se debe solicitar asesoramiento al profesional que lo recetó. Las decisiones de prescripción corresponden exclusivamente al profesional que emite la receta.

Use los medicamentos de manera responsable www.noah.co.uk/responsible www.apha.ie

**Escanee para ver Zenrelia en acción**

JAK: cinasa Janus; PVAS: escala visual análoga del prurito; TYK: tirosina-cinasa

*Una mayor proporción de perros tratados con Zenrelia alcanzó una puntuación <2 en la PVAS al día 112, en comparación con los perros tratados con oclacitinib. Se considera que una puntuación "normal" de picazón es comparable a la de un perro sano y no alérgico (PVAS <2)[6].

1. Trier K et al. Curr Opin Immunol 2018;54:7-12. 2. Huang IH et al. Front Immunol. 2022 Dec 8;13:1068260. 3. Lin CM et al. Mediterr J Rheumatol. 2020;31(Suppl 1):100-104. 4. Bonelli M et al. Ann Rheum Dis 2024;83:139-160. 5. Howell MD et al. Front. Immunol 2019;10:2342. 6. Forster S et al. Vet Dermatol. 2025 Apr;36(2):165-176

Elanco™